



自来水浑浊多年 村民盼“清泉”

连江县东塘村村民称严重影响生活;东湖镇政府表示,改造工程已启动,11月下旬结束

■海都记者 梁展豪 林涓 实习生 朱鸿雨

8月29日,多位福州市连江县东塘村村民向海都报报料称,村中自来水常年浑浊发黄,无法正常使用,严重影响了居民的生活。东湖镇政府表示,多种因素导致水发黄,水管改造工程近期已动工,计划11月下旬就会结束,届时居民用水问题将得到彻底改善。

村民:“一年里有大半年都是这样”

“太脏了,几年下来经常都是这样。”在连江县东塘村里经营着小食店的陈先生指着自已本月29日与30日分别蓄下的两缸水说。只见装满29日水的水缸内浑浊发黄,与30日水缸内的水形成鲜明对比,而29日浑浊发黄的水已经是陈先生使用净化器处理过

的。“我把净水器拆下来洗了一下,全部都是土。”

他出示了一张29日拍摄的水体照片,可以看到水质呈黄色。记者旋开了陈先生家的水龙头开关,观察了3分钟,发现水质清澈。

现场不少村民都向记者反映,村里常年用不到干净的水。“昨天那水黄得吓

人,今天清了我就多装一点备用。”村民王女士说,这些年来,每逢下雨水一定是浑浊的,有时不仅发黄,甚至还会出现发红、发黑。“一年里有大半年的时间都是这样。水不仅颜色不对,有时候还有异味。洗衣服都怕把衣服给洗坏了,更别说用来洗澡了。”

为了解决日常用水,王女士一家只能购买桶装水,或去其他村里挑水饮用,增加了不少麻烦。

同时,东湖镇西庄村也存在水质浑浊的问题。“昨天有点黄,今天好很多。”村民刘大妈说,偶尔会出现水体发黄的情况,但对生活的影响也很大。



明显发黄(受访者供图)

镇政府:多种因素导致水发黄

不过,东湖镇人民政府副镇长梅明良对水质浑浊原因的推断存有疑虑。他告诉记者,东塘村中的用水情况复杂,有的村民是直接抽取山泉水或打井取水;有的山泉水和自来水混用;有的则是私接自来水管,所以浑浊的原因不好确认。

为何自来水浑浊了四年都没有采取措施改善?梅明良解释说,在2021年就已经向县政府反映此问题,

去年才申请成功,近期已顺利动工。

而为了避免类似问题再次发生,此次水管改造工程将全部更换成新设计的水管及水表,提高用水质量的同时也方便日后的收费管理。改造工程计划在11月中下旬结束,届时居民用水问题将得到彻底改善。

村民们何时能够喝上干净的水,海都报将持续关注。

村委会:有村民私接管道 导致自来水串管

在走访中,不少村民认为水质浑浊与自来水厂有关。随后,记者也来到了负责给东塘村、西庄村供水的连江县益民自来水有限公司。

在公司的过滤池边,可以看到里面水质清澈。负责人张先生提供了28日、29日拍摄的自来水池的视

频,视频显示水厂内所过滤后的自来水是清澈的。

“我们每天都对水质进行监测,从水厂出去的水一定是清的,应该是过程中变脏了。”张先生告诉记者,水厂每月实际消耗的水量达1200吨,而水表记录的用水量仅有400多吨,推断是

部分村民从总管里私接管道。

东湖镇东塘村村委会相关负责人表示,虽然村中已经多次进行水管改造,但从2019年起还是经常发生水体发黄或发黑的情况。他推测:首先,在2017年的一次管网改造中,部分村民

从总管上私接管道偷水,并且混用山泉水和自来水,导致不干净的山泉水串管进入自来水系统;其次,东塘村在水管改造时,排水管的尺寸比其他村更小,当水从其他村庄流到东塘村时,很多杂质会残留在管道内,被水流逐渐冲入村里。

6岁娃高烧不退 头发里惊现蜱虫

专家提醒,夏秋季蜱虫病高发,严重的可引起肝、脾损伤,流浪猫、狗也可能携带,孩子应尽量少接触

■海都记者 林宝珍

眼看快开学了,莆田仙游6岁女孩小瑶(化名),却因反复高烧、肝功受损住进了医院。医生在她的头皮里找到了已经死亡、干瘪的蜱虫。幸好经过一周多的抗感染治疗和保肝治疗,小瑶逐渐康复了。

专家提醒,蜱虫叮咬夏秋季高发,户外回来要全身检查,如果家里有养宠物的,到户外活动后,也要认真地检查宠物身上是否附着有蜱虫等。

蜱虫藏在头皮,已干瘪死亡

从8月18日开始,小瑶持续发热,最高体温达到40℃,身上还有许多红色疹子,经当地医院治疗,病情仍无好转。8月24日,小瑶转诊到福建省立医院儿科(金山院区)。

“初步考虑感染可能

性较大,所以首先抽血做了病原学微生物基因的检查。”省立医院儿科(金山院区)张成东医生介绍,血液检查结果很快就出来了,小瑶的外周血中检测到了日本立克次体的序列,这是蜱虫携带的病原体。

医生们认真地对孩子进行了全身检查,也在她的头发中发现了蜱虫虫体和头皮焦痂。

医生们用镊子小心地把仍吸附在小瑶头皮里的虫体夹出来,发现虫体已经死亡、干瘪,大概只有5

毫米左右。最终,孩子被确诊为蜱虫叮咬后引起的“日本立克次体感染”。

孩子身上怎么会有蜱虫?小瑶的家长说,孩子近期的确有去郊外的小溪和密林处玩耍,平时还爱逗流浪猫玩。

“蜱虫病”可损伤脏器,需尽早抗感染治疗

福建省立医院儿科(金山院区)钟日荣主任医师介绍,小瑶感染的日本立克次体,是一种革兰阴性细菌,可引起人类及动物的日本斑点热疾病,典型的临床表现为反复高热、可伴有寒战,全身弥漫性红斑,叮咬部位可见焦

痂等。患者还可能出現肝功能障碍和血小板减少,少数患者出现肝、脾肿大,肌痛和胃肠道症状等。

立克次体病菌主要通过节肢动物传播给人类,最常见的虫媒有蜱虫、虱子和恙螨,又被称为“蜱虫病”,夏秋季是高发季节。

“当人被带菌的虫叮咬,立克次体便从伤口或直接从昆虫口器进入人的血液,并在其中繁殖,从而使人感染得病。”钟主任说,临床症状一般在被叮咬后的5~15天出现,患者身上虽然有红斑或红疹,但一般不会疼痛或瘙痒,伤口也比较

隐蔽,因此无经验者很难与虫咬联系在一起。就像小瑶一样,头皮里的蜱虫已经死亡,估计在她身体停留的时间不短。

被蜱虫等叮咬引起的感染治疗以抗生素为主,应尽早使用抗生素,避免出现并发症。

如何预防蜱虫叮咬?

夏秋季节,草木茂盛,蜱虫等携带日本立克次体的虫活动频繁,立克次体感染高发。那么要如何预防呢?

1. 野外游玩时,尽量身着浅色长袖衣服,减少

皮肤暴露的风险;

2. 尽量缩短在草地上坐卧及密林中停留的时间;

3. 在裸露的皮肤及衣物表面喷涂驱避剂;


4. 户外活动结束后,

及时更换衣物并淋浴,做好全身检查,查看是否有蜱虫叮咬痕迹;

5. 如家里有养宠物,到户外活动后,要认真检查宠物身上是否附着有蜱虫;

6. 如遇蜱虫叮咬,切

勿用力拔除,防止撕伤皮肤组织或将蜱虫头部折断留在皮肤内造成感染,可用酒精、氯仿、煤油、松节油或旱烟涂在蜱虫头部使其自然落下,对伤口进行消毒处理。



建隆制图