



店面突冒浓烟 一男子中毒昏迷

洛阳镇政府发布情况报告称,其在家煮饭烧焦,吸入黑色气体致昏迷,目前无生命危险



海都讯(记者 柳小玲)

见习记者 连铮 文/图)
8月31日晚,泉州台商投资区洛阳镇屿头村埭园小区8栋楼下,一店面突冒滚滚浓烟,隔壁制衣店老板发现后,随即报警求助,发现店内有一男子晕倒,随后其被送往医院救治。

9月1日中午12时左右,记者来到现场看到,事发店面空间较小,店门紧闭。门口挂着“云朵儿甜品屋”的招牌,门口停着的一辆推车和三轮车上,均印有

“衢州鸭头”的宣传图片。

隔壁制衣店的老板黄先生自称是报警人,他介绍,这家店已经不是甜品店,平时都是这名晕倒的男子在店里烹煮鸭头、鸭脖等卤料,再用三轮车载到外面售卖。

8月31日晚,他在店里加班时明显感觉到,事发店里冒出一阵阵浓烟,并伴有烧焦味。黄先生出门一看,店门大部分关闭,浓烟从下门缝冒出,愈来愈浓。

“平时这个时段,他应

该早就出门售卖卤料了,我觉得不对劲,就在9时41分报警。”黄先生说。等到120赶来,他看到店内这名男子已晕倒在地,被医护人员抬上救护车。

“早上男子的两名亲戚有来店里打扫卫生,我老婆听他们说幸好被及时发现,男子去医院后,医生说再晚些到就危险了。”黄先生告诉记者。

记者从泉州消防部门了解到,消防队员到场时该男子已被救出,很快送往医

院,现场发现有三个液化石油气罐已被关闭,他们立即对周边人员进行疏散,利用可燃气体探测仪对现场进行检测发现,浓度还是比较高,即打开后门和阁楼的窗户通风,并切断了电源。

9月1日,洛阳镇政府发布情况报告称,经核实,男子因在家煮饭烧焦,吸入黑色气体导致中毒昏迷,送医途中已苏醒,目前无生命危险。

感谢网友@九牧沉桥
报料,线索费50元

遭胡蜂群攻击 女子多器官衰竭

医生提醒,8月至10月是胡蜂蜇伤的高峰期,若“中招”可遵循6步处理法应对

海都记者 林宝珍
通讯员 郭丽娟 林恒楹

前不久,家住泉州市德化县的黄女士(化名)上山采蘑菇,意外惊扰了一个胡蜂巢,遭到蜂群攻击,很快就不省人事,出现多脏器功能衰竭。其转诊到国家区域医疗中心复旦大学附属华山医院福建医院、福建医科大学附属第一医院(滨海院区)(简称华山医院福建医院)后,经过一系列专业抢救,脱离了生命危险。

多脏器功能损害 抢救5天才脱险

据黄女士家属介绍,黄女士被蜇后,感到头晕、胸闷、全身瘙痒、疼痛难忍,没多久就昏迷倒地不起,家人紧急将其送往当地医院。当地医院检查发现,黄女士已出现多脏器功能损害的

症状,立即为其实施清除残留的毒刺并进行了局部冷敷处理。

由于病情危重,当地医院将其紧急转诊至华山医院福建医院急诊重症监护室(EICU)。

刚转院,黄女士就出现了休克、呼吸困难和酱油色尿等严重症状。检查显示,她的肌红蛋白和肌酸激酶无法测定,同时伴有肝功能异常、肾功能异常、凝血功能异常以及心肌损伤等问

题。面对这一紧急状况,重症医学科肖雄箭副主任医师团队及林建东主任医师迅速启动了紧急救治预案。

经过及时有效的治疗,黄女士在入院第五天脱离生命危险。

8月至10月是蜂蜇伤高峰期

肖雄箭副主任医师提醒,每年8月至10月是胡蜂蜇伤的高峰期,人们户外活动时需提防“夺命之

吻”——蜂蛰伤。

被胡蜂蛰伤后,可能会引发过敏反应及直接毒性反应,导致多种并发症,包

括但不限于局部肿痛、过敏性休克、横纹肌溶解综合征、血管内溶血、急性肾损伤、急性呼吸窘迫综合征、

凝血功能障碍、消化道出血等。重度胡蜂蛰伤的死亡率非常高,如果不及时救治,后果极为严重。

运情况。

挑:用镊子等工具小心地从根部挑出毒刺;避免用力挤压,挤压可加重毒液吸收。

吸:使用负压器具吸出毒素,减少毒素吸收。

冲:冲洗伤口,中和毒素。由于胡蜂的毒液是碱性的,建议使用酸性液体如食醋冲洗;如果不确定是蜜蜂还是胡蜂蛰伤,可用流动清水冲洗。

冷:冰袋冷敷,减轻疼痛和肿胀。

医:一旦出现过敏症状或全身不适,立即就近送医救治。



□小贴士 胡蜂蛰伤如何处理


夏秋季是胡蜂活动较多的季节,多分布在野外植物茂盛的区域。普通人群野外工作或玩耍时尽量穿长袖衣裤。不要追逐蜂群,更不要刺激蜂群。一旦招惹蜂群,要马上采取保护措施,如躲进建筑内关好门窗、就地趴下减少暴露面积、用衣物或其他膜状物覆盖身体,尤其做好面部、手等暴露部位的保护。

若不小心被胡蜂蛰伤,遵循6步处理法应对:

扎:在伤口近心端10厘米处进行绑扎。绑扎时不宜过紧,注意检查肢端血

N 海峡都市报 “讲文明 树新风”公益广告

文明社会 让你不可



中共福建省委文明办
海峡都市报

宣