冬至

里的「虎纠」味儿

福州今起三天天气

21日	多云	8℃~18℃
22日	晴转多云	8℃~14℃
23日	多云	10℃~15℃

N海都记者 吴诗榕 胡婷婷

12月21日,二十四节气中的第22个节气“冬至”来了!这一天,北半球迎来了白昼最为“吝啬”、而黑夜最为悠长的一天。冬至以后,太阳将转头一路向北,阳光的照射与白昼的时间将一天天增加。

自古以来,冬至便是十分重要的一天,被视为不亚于新年的重要节日,故有“冬至大如年”之说。在今天的《谈天说地》中,我们一同来聊聊榕城冬至那些事儿。

多地将迎霜冻 冬至将进一步降温

那银白的冰晶悄然覆盖万物,大地被一层薄纱裹挟,树木枝头挂着霜花。21—22日,最低气温南平西部北部、三明西部和宁德西北部城区可达-2℃~0℃,局部有结冰。南平东部南部、三明东部、龙岩西部、宁德西部和泉州西部城区0℃~4℃,有霜或霜冻。

近几日,福建晴朗少雨,昼夜温差较大,气温持续较低,大部地区最低气温仅个位数,北部接近冰点甚至更低。值得注意的是,南平武夷山齐云峰、宁德屏南东峰尖有可能出现雨雾凇景象。

过去一周,榕城以多云天气为主,20日到22日,福州气温持续较低,内陆和沿海北部城区4℃~7℃,高海拔乡镇-1℃~2℃,有霜或霜冻,局部有结冰。沿海南部城区6℃~9℃,高海拔乡镇3℃~6℃。23—26日,气温小幅回升,27日起受新一股冷空气影响,最低气温将下降5℃~7℃,28日夜晨气温较低。

今年是暖冬还是冷冬?接下来的福州还会更冷吗?记者从福州市气象台获悉,福州市无冬区,没有气象上的冬天,因此没有暖冬冷冬之分。“福州在21日—22日会进一步降温。”

围坐搓“糰” 家家户户小团圆

民间有“冬至大如年”之说,市民们纷纷忙碌起来,为冬至的团圆做准备。

民俗专家邱登辉说,“冬至活动在外地通常是在冬至早上开始,而福州在冬至前一晚上就开始了。”

“因为冬至是小团圆节,需要全员参加,晚上时间比较充裕,上班的、上学的都回家了,大家热闹团聚在一起。”邱登辉介绍,每至此时节,福州人要一家团坐在一起,在欢快愉悦的氛围之中,摆上红蜡烛、红漆筷子、大福橘和“四季花”等吉祥物品,共同搓“糰”。

这一传统习俗象征着团圆和幸福,也让人们在忙碌的生活中找到了一份家的温馨。“糰”在福州话中发音为“细”,也叫“拔隆细”,是一种用糯米制成的传统食品。制作过程中,一大家老老少少会围坐着大竹箩坐在一起,欢声笑语不断。

除了搓“糰”,福州冬至还有一个独特的吉祥物——用泥土捏成的“土人仔”,人们常把它写成“回进宝”,寓意着大吉大利、回回进宝。这一可爱的形象不仅增添了节日的喜庆氛围,也寄托了人们对美好生活的向往。

冬至一阳生 养生“有一套”

除了极具“虎纠”味儿的“糰”,还有“冬至一阳生”的说法,福建中医药大学国医堂中医健康管理(治未病)中心廖水亨主治医师提醒大伙,冬至养生,一要避寒保暖,二要运动强身,三要精神内守。

“冬至期间昼短夜长气候严寒,在作息上宜早卧晚起,等太阳初升后再起床。睡眠安则阴气敛、阴精盛,阴气敛、阴精盛而阳气才能生和升。”廖水亨表示,顺应自然的睡眠可以为初生的“阳”提供孵育的温床。

除此之外,还要常常搓手。“在寒冷的冬至时节,常搓手对健康大有裨益。人的手上有很多重要穴位,通过揉搓手掌、揉按手指可充分刺激位于手心的劳宫穴,让心脏逐渐兴奋起来;经常刺激位于双手拇指根部隆起处的鱼际穴,可疏通经络,增强呼吸系统功能,预防感冒。”

廖水亨建议,冬日里运动要适度,以周身发热,无汗或微汗为佳,不可大汗,要符合“无泄皮肤”的原则。可多做静功,比如太极拳、八段锦、五禽戏、瑜伽、慢跑、散步等这样轻缓运动才能与冬相应,才有利于养藏。

冬令进补,如何管好血脂?

本报邀请专家做客海都直播间,分享冬季护心“秘诀”

N海都记者 林宝珍

今天是冬至,到了“冬令进补”最佳时节。不过,专家提醒,进补的同时,也要多多注意心血管的健康问题。12月20日晚,福建医科大学附属协和医院心血管内科陈昭阳教授、福州大学附属省立医院心内三科陈威教授,做客海都直播间,共同进行了“血脂双达标 护心稳过冬”的科普直播。直播中,两位专家分享很多冬季护心“秘诀”,并纠正了很多常见的血脂管理误区。

专家做客海都直播间

血脂报告没“箭头” 就算达标了吗?

“我们现在的检查报告只有一个正常值,这很容易让体检者产生误解。”直播中,陈昭阳教授表示,血脂是否达标,不能只看血脂报告单的“箭头”,对于不同的人,降血脂有不同的目标值。

对于普通人,如果确定血管没有狭窄,低密度脂蛋白胆固醇值就可以比较宽松一点,按照报告上的正常值就行,也就是小于3.4mmol/L就算达标。

如果有一些危险因素,如高血压、吸烟、肥胖、慢性肾病,以及女性大于55岁、男性大于45岁,就需要将低密度脂蛋白胆固醇降到2.6mmol/L;对于冠心病患者(即心脏的血管狭窄大于50%),或者曾经发生过心梗、脑梗,或者做过心脏支架,以及有糖尿病的人群来说,低密度脂蛋白胆固醇更需要严格控制,需要小于1.8mmol/L,并且降低的幅度较基础数值要大于50%。对于超高危的人群,比如,做过多次心脏支架或者多次发生心梗,低密度脂蛋白胆固醇就需要降到小于1.4mmol/L,并且较基础的数值降幅也要大于50%。

陈昭阳教授表示,尽早且长期稳定地将低密度脂蛋白胆固醇水平控制在目标范围内,有助于动脉粥样硬化的防控,减少心血管事件发生的风险。

血管出现斑块 还能“逆转”吗?

福州大学附属省立医院心内三科主任医师陈威教授说,出现血管斑块,很大一部分是因为低密度脂蛋白胆固醇,也就是所谓的“坏胆固醇”。“所以我们需要更好地把血脂降到一个比较合理的范围,并且长期地保持在一个比较低的水平,斑块才能减少进展。”

陈威教授表示,如果血管已经出现斑块,首先是生活方式的改变,包括健康饮食、合理运动;其次是选择合适的降脂药物。他说,目前降脂药物有几种,最常见的是他汀类药物,是通过抑制肝脏合成胆固醇来降低低密度脂蛋白胆固醇;其次是胆固醇吸收抑制剂,是通过抑制胆固醇的吸收来减少胆固醇,现在又有了注射剂PCSK9抑制剂。对于一些高危患者来说,对低密度脂蛋白胆固醇控制的要求更高,往往需要联合用药才能实现血脂长期达标。

陈威教授表示,高血脂患者要根据危险因素分层来选择降脂药物,才能达到合理的目标,提高生活质量。

心脏装了支架 是不是就“高枕无忧”了?

冠心病分为急性与慢性两种。急性冠状动脉综合征通常需要通过介入或手术治疗,如经皮冠状动脉介入治疗,也就是常说的心脏支架手术治疗。治疗过程虽然能够显著改善冠状动脉的血流状况,但并非治愈疾病本身。患者仍处于心血管事件再发高风险状态,尤其最初3个月是复发风险最高的时期,而低密度脂蛋白胆固醇是导致复发的主要危险因素。如果不注意控制,支架处可能会再度狭窄,未放支架的部位可能形成新的动脉粥样硬化斑块。

因此,两位专家在直播中提醒术后患者仍需严格管理血脂等危险因素,并定期复查低密度脂蛋白胆固醇等指标水平,坚持药物治疗、健康饮食、适量运动等综合管理措施,长期将指标控制在目标范围内,才能保护心血管健康。