

母猪护崽发怒 咬伤六旬农妇

事发泉州南安;医生提醒,猪虽属“低风险类”家畜,被咬伤也须及时注射狂犬病疫苗

N海都记者
刘薇 文/图

4日,海都记者在医院病房见到陈阿姨时,她的左手缠着厚厚的绷带,掀开衣物,腹部两块碗口大的淤青清晰可见。病床上,陈阿姨缓缓道出了事发经过。

因为年纪大了,陈阿姨今年没再外出打工,而是养了头母猪,计划用家养的猪肉做扁食售卖,此后母猪

“被猪咬伤虽不常见,但并非个例。”郭医生介绍,近年来,医院收治过猪咬断手指、手部皮肤大面积撕脱露骨,甚至喂猪时被咬伤的患者。

他解释,猪、牛、羊等家畜通常温顺,但在特殊时期

“唉,再也不敢养了!回去就把它处理掉!”在泉州仁福骨外科医院的病床上,61岁的南安陈阿姨望着缠着厚厚绷带的左手,满脸懊悔。

不久前,陈阿姨家中饲养的母猪下了一窝崽,就在地准备抓小猪阉割时,却遭护崽母猪疯狂咬伤,目前仍在住院治疗。

突遭母猪猛咬 手掌鲜血直流

顺利产下一窝猪崽,其中有4只小公猪。7月28日,眼看小猪快满月,她打算将小公猪送去阉割。起初一切顺利,3只小公猪被抓出,然而,就在她进入猪圈找第四只时,意外突然发生。

“小猪和母猪一直叫,我没当回事,结果母猪突然冲上来,顶着我的肚子一直咬!”陈阿姨回忆,她

家畜伤人并非个例 特殊时期易触发攻击

攻击性极强,“尤其是母猪待产、产崽、护崽阶段,或家畜处于发情期时,极易将人视为威胁发起攻击。”

不少人感到疑惑:被猪咬伤也需要打狂犬病疫苗吗?郭医生强调,狂犬病

急忙抓起扫把驱赶,愤怒的母猪却转而扑向她的左手,锋利的牙齿瞬间将她的手掌咬得鲜血直流。最终,她挣脱爬出猪圈,被家人紧急送医。

当地医院为陈阿姨缝合了伤口,并接种了狂犬病疫苗、免疫球蛋白和破伤风针。但两天后,伤口出现流脓、剧痛,她随即转

至仁福医院进一步诊治。接诊的郭一猛主治医师检查发现,其左手多处被咬伤,肌腱、血管均受损,手背伤口感染化脓,所幸腹部仅轻微擦伤。

当天,经彻底清创、修复受损组织并重新缝合后,陈阿姨被收住院进一步治疗。目前恢复良好,预计几天后即可出院。



医生查看陈阿姨的伤势

小贴士

被家畜咬伤后这样处理

郭医生提醒,若不幸被猪等家畜咬伤,需立即采取正确急救措施:

- 彻底冲洗伤口:用流动清水和肥皂水持续冲洗伤口15分钟以上,尽可能清除唾液和污染物。
- 及时就医:尽快前往

有犬伤治疗资质的正规医疗机构,由医生评估伤口深度和感染情况,必要时进行清创、缝合或组织修复。

3.规范接种疫苗:按医嘱接种狂犬病疫苗、免疫球蛋白,并根据伤口情况注射破伤风针,避免感染并发症。

掰碎了吃、用饮料送服……专家提醒不当用药风险

“讨巧”吃药 小心危害健康

Z
新华社

近日,有知名男星在网络分享“干吞”药物蒙脱石散导致短暂窒息的经历,引发关注。蒙脱石散为什么不能“干吞”?掰碎了吃、用饮料送服等“讨巧”的服药方式,是否可取?不当用药会带来哪些风险?对此,记者采访了有关专家。

蒙脱石散“干吞”很危险

这位男星称,日前因肠胃不适买了蒙脱石散。第二天搭乘高铁时,他为图省事,“干吞”蒙脱石散。药物迅速膨胀,粉剂直接扩散到整个咽喉和鼻腔,窒息了大概有3秒。他剧烈咳嗽,好不容易才缓过来。

不少网友也在社交平台分享“干吞”蒙脱石散的惊险经历。有一名网友说:“它像水泥一样糊住我的喉咙,喊不出来,不敢咳嗽,伸长了脖子企图得到一点喘息,没用。最后尽力张大嘴,把没湿的粉末抠出来,才敢咳嗽两下,憋得眼睛通红,喝了几口水才缓过来。”

对此,中山大学附

属第六医院药学部主任黎小妍解释,蒙脱石散是一种矿物类药物,具有遇水膨胀、吸附等特性,对消化道内的病毒、病菌及其产生的毒素有固定、抑制作用。服药时应将蒙脱石散倒入适量温水中,充分搅拌为混悬液后服下,不能直接倒入口中服用。

“‘干吞’可能会使粉末飘散在口腔内,随着呼吸进入气道导致呛咳、梗塞等风险。”黎小妍说,“蒙脱石散混悬液需要到达肠道发挥作用,吞服粉剂后在口腔咽部就开始膨胀,无法发挥药效。”

深圳大学附属华南医院医学部助理主任傅声玲表示,一些患者不遵医嘱,不看说明书,想当然服药,真让医生捏把汗。

——“干吞”药物。

浙江宁波35岁的张先生因咽喉不适,自行服用了多西环素肠溶胶囊。他在服药时,只喝了一小口水便匆匆躺下睡觉。次日一早,张先生便出现了胸痛、吞咽困难等症状。紧急就医后,医生通过胃镜发现他的食管黏膜布满溃疡,经分析,这正是药物长时间滞留食管导致的“药物性食管溃疡”。

中山大学附属第一医院主任药师唐欲博说,“干吞”药片或胶囊,容易导致药物黏附在食管黏膜上,停留时间较长,从而刺激和损伤食管黏膜,引起恶心呕吐,长期不当服用的话可能造成黏膜溃疡。此外,泡腾片尤其不能直接放入口中含服或者吞服。傅声玲表

“想当然”服药要不得

示,它在口腔或喉咙中遇唾液会迅速崩解,产生的大量气体可能导致窒息。

——药片掰开、胶囊拆开吃。

南方医科大学南方医院药学部副主任郑萍说,缓释片、控释片、肠溶片或肠溶胶囊等特殊剂型,服用时通常需要保证其完整剂型,不能掰开、咬碎服用。

例如降压药物硝苯地平控释片在体内缓慢释放药量,实现一天只需要服药1次,一天血压控制的目标;肠溶片需要进入肠道后再释放有效成分,避免药物在胃部过早释放刺激食道和胃黏膜。“如果患者把这类药掰开,破坏了药品的特殊剂型,就起不到相关的作用了。”

几天前,南方医科大学南方医院收治了一名高血压患者。该患者因近期反复头晕,并发生跌倒,入院治疗。临床药师在询问既往用药史后,发现患者在服用硝苯地平控释片时,将本

该整片服用的药物掰半服用。“这就相当于没有了控释效果,变成速释药,导致血压快速下降,造成头晕摔倒。”郑萍说。

——用饮料送服。

傅声玲表示,服药最好用清水,果汁、牛奶、茶水或咖啡等饮料,不少跟药物同时服用都会影响药物的吸收,甚至发生相互作用而导致药效降低。

唐欲博说,西柚汁、橙汁本身是肝药酶抑制剂,用这些果汁送服,会导致一些药物在体内代谢减慢,在血液中浓度升高,例如降血脂的他汀类药物,都需要经过肝药酶来代谢,因此不宜跟西柚汁、橙汁同服;茶水含多种活性成分,用茶水送服某些药物,茶水中的鞣酸可能会与药物中的成分发生相互作用生成不溶性物质,影响药物吸收;牛奶中含有的钙、镁离子,会跟药物成分结合生成络合物,影响药物生物利用度和作用效果。

如何正确服药?

遵医嘱、读说明书、及时咨询

专家表示,采用正确的服用方法才能够充分保证药物的疗效,减少药物的不良反应。

要严格遵循医嘱。郑萍说,有些药物需要在饭前空腹服用,例如老年人常用的抗血小板药物阿司匹林肠溶片,如果把它放到饭后吃,就会导致胃部不适。

医生提醒,患者服药之前需要仔细阅读药品说明书,了解正确服用药物的方法。

“如果患者同时需要服用多种药物,药物和药物之间可能会存在相互影响,这时应当咨询药师,可以通过线下或线上药学门诊咨询。”郑萍说。

傅声玲表示,现在医院药学部或药剂科通常设有药学门诊或者驻科临床药师,门诊用药的患者可咨询药学门诊的药师;住院期间患者的用药问题可以咨询驻科临床药师。

分类信息

广告热线: 0595-22567990
13599101718

遗失声明

深圳市正昌隆管业有限公司遗失漳州市励欧房地产开发有限公司2025年6月12日开具销售单白联XOUT045320、XOUT045321,现声明作废。

遗失声明

泉州市洛江区罗溪丁山造林队(统一社会信用代码:92350504MA2YMMGL53)遗失圆形铜质公章一枚,印章编码:3505040003303,声明作废。

遗失声明

厦门絮蕊飞尘科技有限公司遗失公章、财务章、发票章,声明作废。

分类广告

咨询服务热线:
22567990